

V Conferenza Nazionale di Trieste sulle Tossicodipendenze

12-14 Marzo 2009

Abstract di Luigi Cancrini

Le patologie psichiatriche correlate alla dipendenza da farmaci sono state studiate su una casistica di circa 1100 utenti seguiti in 12 anni di attività dalle Comunità Terapeutiche per doppie diagnosi di Saman a Latina (Comunità “Le vergini nuove”), Ravenna (Comunità “Villa Cilla”) e Apricena (Comunità “Apricena”).

Le osservazioni fondamentali riguardano:

1. la abituale scarsa rilevanza della diagnosi posta in Asse I del DSM IV;
2. la presenza larga ed invece assai rilevante di diagnosi poste in Asse II dello stesso DSM IV;
3. la prevalenza in questo ambito di disturbi riferibili al BPD (disturbo border line di personalità) riscontrabili, peraltro in molti utenti che non avevamo ricevuto come doppia diagnosi;
4. la possibilità di verificare, in tutta una grande maggioranza di questi utenti, l'utilità fondamentale di un lavoro centrato su competenze di livello psicoterapeutico e la rilevanza solo sintomatica e a breve termine degli altri trattamenti (sostitutivi o psicofarmacologici);
5. la necessità di sottolineare segnalato dai casi clinici e della letteratura, su tempi medi e lunghi, l'andamento positivo di questo tipo di problematiche.